

APROXIMACION DE FUNCIONES

POR

POLINOMIOS DE CHEBISHEV

Diogenes ROJAS

1. INTRODUCCION

Los polinomios de Legendre se pueden obtener ortogonalizando las funciones

$$(1) \quad 1, x, x^2, \dots, x^n, \dots$$

con respecto al producto escalar $\int_{-1}^1 f(x) q(x) dx$ correspondiente a la medida habitual de Lebesgue en el segmento $[-1,1]$. Si se define en este segmento otra medida que satisface la condición de que las funciones (1) sean linealmente independientes en el espacio correspondiente y se aplica el proceso de ortogonalización, se obtiene un sistema de polinomios que depende en general de la selección de la medida.

Supongamos que la medida se define para los sub-conjuntos medibles del segmento $[-1,1]$ mediante

$$(2) \quad u(E) = \int_E g(x) dx$$

donde $g(x)$ es una función sumable no negativa fija ; en este caso la condición de ortonormalidad

$$(3) \quad (P_m, P_n) = \begin{cases} 1 & \text{para } m = n \\ 0 & \text{para } m \neq n \end{cases}$$

es de la forma

$$(4) \quad \int_1^1 P_m(x) P_n(x) g(x) dx = \begin{cases} 1 & \text{para } m = n \\ 0 & \text{para } m \neq n \end{cases}$$

La función $g(x)$ que define la medida (2) es llamada núcleo o función de peso ; por ésto los polinomios que verifican la condición (4) se dicen ortogonales con respecto al núcleo $g(x)$.

La selección del núcleo lleva a diferentes sistemas de polinomios ortogonales . Si en particular se toma

$$g(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \quad \text{los polinomios obtenidos coinciden, sal-}$$

vo un coeficiente constante , con los polinomios de Chebishev que se definen mediante la fórmula

$$(5) \quad T_n(x) = \cos n \arccos x \quad (n = 1, 2, \dots)$$

Estos polinomios son importantes en diferentes problemas de interpolación , ya que el error , cuando se usan aproximaciones basadas en series de Maclaurin , es pequeño

pero no uniforme en el centro del intervalo y crece muy rápidamente en los extremos del intervalo ; en cambio el error en la aproximación con polinomios de Chebishev tiene un comportamiento más uniforme .

2. POLINOMIOS DE MEJOR APROXIMACION

Cuando se aproxima una función $f(x)$ por un polinomio de grado n

$$(6) \quad P_n(x) = a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n$$

se puede medir la desviación entre la función y el polinomio por la llamada norma de máximo :

$$(7) \quad \| f(x) - P_n(x) \|_{\infty} \\ = \max_{a \leq x \leq b} | f(x) - P_n(x) | = E(f, P_n)$$

Un polinomio que minimice esta norma convencionalmente se dice que es un polinomio de mejor aproximación . La ecuación (7) define una función de $n + 1$ coeficientes a_i :

$$(8) \quad d(a_0, a_1, \dots, a_n) = \max_{a \leq x \leq b} | f(x) - P_n(x) |$$

Un polinomio de mejor aproximación se caracterica

za por un punto \tilde{a} en el espacio de dimensión $n+1$ donde $d(\tilde{a})$ es mínimo.

Dada $f(x) \in C[a, b]$, se sabe que existe al menos un polinomio $P_n(x) \in P_n(x)$ (espacio de polinomios de grado menor o igual a n), tal que

$$\min_{P_n \in P_n} = \max_{a \leq x \leq b} |f(x) - P_n(x)|$$

Caractericemos este polinomio de mejor aproximación en el sentido de Chebishev.

3. TEOREMA DE CHEBISHEV (alternación del signo, equioscilación)

Si el polinomio $P_n(x)$ de grado $\leq n$ es el de mejor aproximación de $f(x)$ en $[a, b]$, entonces existen a lo menos $n+2$ puntos $x \in [a, b]$ donde

$$e(x) = f(x) - P_n(x)$$

toma los valores extremos $\pm E_n$ y si en un punto vale $+E_n$ en el punto siguiente vale $-E_n$.

Se debe demostrar que $e(x)$ toma alternativamente los valores $+E_n$ y $-E_n$ en al menos $n+2$ puntos $x_1, a \leq x_1 \leq x_2 \leq \dots \leq x_{n+2} \leq b$

Demostremos primero que $e(x)$ toma al menos una vez el valor $+E_n$ y el valor $-E_n$.

La función $e(x)$ toma uno de estos valores sin que E_n sea necesariamente el máximo del error. Supongamos que tome el valor $+E_n$ y demostremos que toma $-E_n$: en efecto si no alcanza el valor $-E_n$ se tiene $-E_n < e(x) \leq E_n$ y existe entonces una constante $h > 0$ tal que $-E_n + 2h \leq e(x) \leq E_n$ y por lo tanto

$$-E_n + h \leq f(x) - [P_n(x) + h] \leq E_n - h \text{ y } P_n(x)$$

no es polinomio de mejor aproximación en el sentido de Chebishev en $[a, b]$, éste sería $P_n(x) + h$ que da un error máximo $E_n - h \leq E_n$.

Demostremos ahora que en $[a, b]$ el número de puntos de contacto $-E_n$ y $+E_n$ es mayor o igual a $n + 2$. Como $e(x) \in C[a, b]$ podemos dividir el intervalo $[a, b]$ en intervalos consecutivos tan pequeños como sea necesario para que, si $e(x)$ alcanza uno de sus valores extremos en uno de estos intervalos, no se anule en él.

Sea $\delta_1, \delta_2, \dots, \delta_m$ la sucesión de intervalos donde $e(x)$ toma uno de sus valores extremos.

Reagrupamos los δ_i en varios conjuntos ψ_j .

Cada uno de éstos debe contener al menos un δ_i , de tal manera que todos los δ_i sucesivos donde $e(x)$ es del mismo signo, pertenezcan al mismo ψ_j y que los δ_i sucesivos donde $e(x)$ es de signo diferente, pertenezcan a otro ψ_j . Se obtiene así una sucesión ψ_1, ψ_2, \dots de conjuntos disyuntos. Tal agrupamiento es posible ya que entre dos intervalos δ_i consecutivos debe existir un intervalo donde $e(x)$ pasa de $+E_n$ a $-E_n$, es decir se anule, lo que no sucede en ningún δ_i , luego éstos son disyuntos. En cada conjunto ψ_j , $e(x)$ es de signo constante. Los signos que caracterizan dos conjuntos ψ_j forman una alternancia. Supongamos que existen m alternancias de signo, o lo que es lo mismo, que existen a lo menos $m+1$ puntos donde $e(x)$ toma los valores $+E_n, -E_n$, alternativamente.

Demostremos que $m+1 \geq n+2$, ó, $m \geq n+1$.

Consideremos los puntos donde $e(x)$ se anula. De acuerdo a la hipótesis hay m , y pertenecen a los intervalos que separan los ψ_j . Los denotaremos $\epsilon_1, \dots, \epsilon_m$.

Construyamos el polinomio de grado m .

$$\phi(x) = (\epsilon_1 - x) (\epsilon_2 - x) \dots (\epsilon_m - x)$$

Supongamos que $m < n+1$. Entonces $\phi(x) \in \mathbb{P}_n$, es decir, un polinomio a lo más de grado n . Notemos que $\phi(x)$ cambia de signo cuando pasa por un ϵ_i , o sea, el signo de $\phi(x)$ en ψ_k es contrario al signo de $\phi(x)$ en ψ_{k+1} . Luego $\phi(x)$ cambia de signo con $e(x)$ cuando pasa de ψ_k a ψ_{k+1} . Si se desea que $\phi(x)$ y $e(x)$ tengan el mismo signo, se puede cambiar la definición de $\phi(x)$ como sigue

Sea $\phi(x) = \prod \text{signo } e(x) \text{ en } \psi_j(x) \prod (\epsilon_1 - x)(\epsilon_2 - x) \dots (\epsilon_m - x)$.
 Luego $\phi(x)e(x) > 0$ para todo ψ_j , $1 \leq j \leq m+1$

Construyamos el polinomio $p_n(x) + \epsilon\phi(x)$ que sea el de mejor aproximación de $f(x)$, donde ϵ es positivo y suficientemente pequeño tal que

$$|f(x) - (p_n(x) + \epsilon\phi(x))| < E_n \quad x \notin \psi_j$$

Esto es posible, ya que si $x \notin \psi_j$ entonces

$|f(x) - p_n(x)| < E_n$. Si $x \in \psi_j$, $e(x) = f(x) - p_n(x)$ y $\epsilon\phi(x)$ son del mismo signo, por lo tanto se tiene

$$|f - p_n - \epsilon\phi| = |f - p_n| - \epsilon|\phi| \leq E_n - \epsilon|\phi|$$

luego $|f - p_n - \epsilon\phi| \leq E_n$ para $x \in \psi_j$

Entonces si $m < n+1$ existe un polinomio $p_n(x) + \epsilon\phi(x)$ que pertenece a \mathbb{P}_n y que da una mejor a-

proximación de $f(x)$ en $[a, b]$ lo que es contradictorio, luego $m \geq n+1$

Entonces el número de puntos donde $e(x)$ toma los valores $+E_n$, $-E_n$ alternativamente es al menos igual a $n+2$.

Aplicación: Hallar el polinomio mini-max de primer grado o menor grado sobre el intervalo $[a, b]$ para una función $f(x)$ con $f''(x) > 0$.

Sea $p(x) = Mx + B$ el polinomio buscado. Debemos hallar tres puntos $x_1 < x_2 < x_3$ en (a, b) para los cuales $e(x) = f(x) - p(x)$, tome sus valores extremos con signos alternados. Uno de estos puntos x_2 está en el interior de $[a, b]$ y requiere que $e'(x_2) = 0$, o sea, $f'(x_2) = M$. Como $f''(x) > 0$, $f'(x)$ es estrictamente creciente y puede ser igual a M una sola vez, lo que significa que x_2 puede ser el único punto interior extremo. Así $x_1 = a$ y $x_3 = b$. Finalmente

$$f(a) - p(a) = - |f(x_2) - p(x_2)| = f(b) - p(b)$$

resolviendo tenemos

$$M = \frac{f(b) - f(a)}{b-a}$$

$$B = \frac{f(a)+f(x_2)}{2} - \frac{(a+x_2) [f(b) - f(a)]}{2(b-a)}$$

con x_2 determinado por $f'(x_2) = \frac{f(b) - f(a)}{b-a}$



4. TEOREMA DE UNICIDAD

Si para n fijo existe un polinomio $p_n(x)$ de mejor aproximación de $f(x)$, este polinomio es único.

Supongamos que existen dos polinomios de mejor aproximación y de grado n , $\bar{p}_n(x)$, $\bar{\bar{p}}_n(x)$. Por hipótesis

$$-E_n \leq f - \bar{p}_n \leq E_n \quad -E_n \leq f - \bar{\bar{p}}_n \leq E_n$$

luego
$$-E_n < f - \frac{\bar{p}_n + \bar{\bar{p}}_n}{2} < E_n$$

y el polinomio $\frac{\bar{p}_n + \bar{\bar{p}}_n}{2}$ es a su vez un polinomio de mejor aproximación. Apliquemos a este polinomio el teorema de Chebishev. La función

$$e(x) = f(x) - \frac{\bar{p}_n(x) + \bar{\bar{p}}_n(x)}{2}$$

toma al menos $n+2$ veces alternativamente los valores $\pm E_n$.

Existe entonces un conjunto compuesto al menos

de $n+2$ puntos x_i tal que

$$f(x_i) - \frac{\bar{p}_n(x_i) + \underline{p}_n(x_i)}{2} = \pm (-1)^i E_n$$

$$\delta, \quad \frac{f(x_i) - \bar{p}_n(x_i)}{2} + \frac{f(x_i) - \underline{p}_n(x_i)}{2} = \pm (-1)^i E_n$$

Como el máximo de cada uno de estos dos términos es $\frac{E_n}{2}$, la relación anterior se verifica si se tiene si multáneamente

$$\frac{f(x_i) - \bar{p}_n(x_i)}{2} = \pm \frac{E_n (-1)^i}{2}$$

$$\frac{f(x_i) - \underline{p}_n(x_i)}{2} = \pm \frac{E_n (-1)^i}{2}$$

o sea, $\bar{p}_n(x_i) = f(x_i) \mp E_n (-1)^i$, $\underline{p}_n(x_i) = f(x_i) \mp E_n (-1)^i$ luego los dos polinomios toman el mismo valor en a lo menos $n+2$ puntos, y como son de igual grado, son idénticos.

5. RECIPROCO DEL TEOREMA DE CHEBISHEV

Sea $f(x) \in C[a, b]$. Sea $p_n(x) \in P_n$

con $\max_{a \leq x \leq b} |f(x) - p_n(x)| = \delta$.

Si existen $n+2$ puntos x_i ; $a \leq x_1 \leq x_2 \dots \leq x_{n+2} \leq b$ tales que $f(x_i) - p_n(x_i) = \pm \delta$ con alternancia de signo, entonces $\delta = E_n(f)$ y $p_n(x)$ es el polinomio de mejor a aproximación de $f(x)$ en $\overline{[a, b]}$.

Por definición, si $p_n(x)$ es el polinomio de mejor aproximación de f en $\overline{[a, b]}$, se tiene

$$E_n(f) = \max_{a \leq x \leq b} |f(x) - p_n(x)|$$

y $E_n(f) \leq \delta$. Supongamos que $E_n(f) < \delta$. Sea

$$q_n(x_i) - p_n(x_i) = f(x_i) - p_n(x_i) - \overline{[f(x_i) - q_n(x_i)]}.$$

Como $\max_{a < x < b} |f(x) - p_n(x)| = E_n(f) < \delta$,

si tomamos $t_i = f(x_i) - q_n(x_i)$

se tiene $|t_i| < \delta$ y $q_n(x_i) - p_n(x_i) = \pm \delta - t_i$

luego $q_n - p_n$ cambia $n+2$ veces de signo luego tiene

$n+1$ raíces; ésto implica que $p_n(x) = q_n(x)$.

6. COROLARIO (TEOREMA DE LA VALLEE POUSSIN)

Si $f(x) - p_n(x)$ es de signo alternado en $n+2$

puntos del intervalo $[a, b]$ y en uno de estos puntos el valor absoluto de $f(x) - p_n(x)$ es mayor o igual a p' , entonces p' es una cota inferior de E_n .

Tomemos $p' = \min_{x_i} |f(x_i) - p_n(x_i)|$ y demostremos que $p' < E_n$.

Supongamos que se tiene $p' \geq E_n$

donde $E_n = \max_{a \leq x \leq b} |f(x) - q_n(x)|$.

Entonces, de $q_n - p_n = f - p_n - (f - q_n)$, se tiene:

$$q_n(x_i) - p_n(x_i) = f(x_i) - p_n(x_i) - [f(x_i) - q_n(x_i)].$$

Sea $q_n(x_i) - p_n(x_i) = p_1 - t_1$ ó $|t_1| \leq E_n < p' \leq p_1$,

luego $q_n(x) - p_n(x)$ cambia $n+2$ veces de signo y tiene $n+1$ raíces, lo cual no es posible.

7. DEFINICIONES

Definimos los polinomios de Chebishev de primera especie de la manera siguiente:

$$T_n(x) = \cos(n \arccos x) \quad -1 \leq x \leq 1$$

$$T_n(x) = \cosh(n \operatorname{arg} \cosh x) \quad |x| > 1$$

Definimos los polinomios de Chebishev de segunda

especie , así :

$$V_n(x) = \text{sen}(n \arccos x) \quad |x| \leq 1$$

$$V_n(x) = \text{senh}(n \text{argcosh } x) \quad |x| > 1$$

A partir de las anteriores definiciones se pueden construir los polinomios trasladados al intervalo

$$0 \leq x \leq 1 .$$

Para comprobar el carácter polinomial de $T_n(x)$ procedemos de la siguiente forma :

Si $T_n(x) = \cos(n \arccos x)$ y $\theta = \arccos x$, entonces $x = \cos \theta$;

$$\begin{aligned} \text{luego } T_n(x) &= \cos n\theta = \text{Re}(\cos n\theta + i \text{sen } n\theta) = \text{Re}(e^{in\theta}) \\ &= \text{Re}(e^{i\theta})^n = \text{Re}(\cos\theta + i \text{sen } \theta)^n \end{aligned}$$

$$T_n(x) = \text{Re}(x + i\sqrt{1-x^2})^n = \text{Re} \sum_{k=0}^n C_k^n x^{n-k} i^k (1-x^2)^{k/2}$$

Si $k = 2j$, la parte real de la suma se obtiene haciendo $j = \frac{k}{2}$ y haciendo la suma hasta $n/2$.

$$T_n(x) = \sum_{j=0}^{n/2} i^{2j} C_{2j}^n x^{n-2j} (1-x^2)^j$$

$$= \sum_{j=0}^{n/2} (-1)^j C_{2j}^n x^{n-2j} (1-x^2)^j$$

Si $k = 2j+1$ la parte real de la suma se obtiene efectuando la suma hasta $j = \frac{n}{2} - \frac{1}{2}$

$$T_n(x) = \sum_{j=0}^{\lfloor n/2 \rfloor} \binom{n}{2j} (-1)^j k^{n-2j} (1-x^2)^j$$

Si n es par, T_n tiene únicamente potencias pares de x y si n es impar, tiene únicamente potencias impares de x .

8. APLICACIONES

8.1 Ecuación de recurrencia a tres términos.

Los polinomios de primera clase o especie, se han definido como $T_n(x) = \cos(n \arccos x) = \cos n \theta$
 $x = \cos \theta \quad -1 \leq x \leq 1 \quad -\pi \leq \theta \leq \pi$.

Luego $T_{n+1}(x) = \cos(n+1)\theta = \cos n\theta \cos \theta - \sin n\theta \sin \theta$

$T_{n-1}(x) = \cos(n-1)\theta = \cos n\theta \cos \theta + \sin n\theta \sin \theta$
 y sumando se obtiene

$$T_{n+1}(x) + T_{n-1}(x) = 2x T_n(x)$$

que es la ecuación de recurrencia a tres términos y se puede empezar con $T_0(x) = 1$, $T_1(x) = x$

8.2 Obtención de una función generatriz

Partimos de

$$\sum_{n=0}^{\infty} t^n e^{in\theta} = \frac{1}{1-te^{i\theta}} \quad t < 1$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} t^n e^{-in\theta} = \frac{1}{1-te^{-i\theta}} \quad t < 1$$

luego
$$\sum_{n=0}^{\infty} t^n (e^{in\theta} + e^{-in\theta}) = \frac{1}{1-te^{i\theta}} + \frac{1}{1-te^{-i\theta}} =$$

$$\frac{1 - t(e^{i\theta} + e^{-i\theta}) + 1}{1 - t(e^{i\theta} + e^{-i\theta}) + t^2}$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} t^n \cos n\theta = \frac{1-tx}{1-2tx+t^2}$$

se obtiene entonces

$$\frac{1-tx}{1-2tx+t^2} = \sum_{n=0}^{\infty} t^n T_n(x)$$

es decir, para generar $T_n(x)$ se divide $1-tx$ por

$$1-2tx+t^2.$$

8.3 Como solución de una Ecuación Diferencial

Con la aplicación del método de FROBENIUS a la ecuación diferencial

$$(1-x^2) \frac{d^2 y}{dx^2} - x \frac{dy}{dx} + n^2 y = 0$$

para $|x| < 1$, se obtienen las soluciones no singulares

$$y_1(x) = 1 - \frac{n^2}{2!} x^2 - \frac{(2^2-n^2)n^2}{4!} x^4 - \frac{(4^2-n^2)(2^2-n^2)n^2}{6!} x^6 - \dots - \frac{[(2m)^2 - n^2] \dots (2^2-n^2)n^2}{(2m)!} x^{2m} - \dots$$

$$y_2(x) = x + \frac{1-n^2}{3!} x^3 + \frac{(3^2-n^2)(1-n^2)}{5!} x^5 + \dots + \frac{[(2m+1)^2 - n^2] \dots (1-n^2)}{(2m+1)!} x^{2m+1} + \dots$$

que terminan con x^n cuando n es par o impar, así pues si $n = 0$, $y = 1$; si $n = 1$, $y = x$; si $n = 2$, $y = 1 - 2x^2$; si $n = 3$, $y = x - \frac{4}{3} x^3$

que convenientemente normalizados dan lugar a los polinomios de Chebishev. También se puede obtener de la función hipergeométrica que se logra como solución de la ecuación hipergeométrica, por el método de Frobenius.

9. ALGUNAS PROPIEDADES

9.1 $T_n(x)$ es un polinomio de grado n en x . Si n es par $T_n(x)$ es un polinomio par, si n es impar $T_n(x)$ es un polinomio impar.

9.2 El coeficiente de x^n en $T_n(x)$ es 2^{n-1} . Es suficiente observar en la recurrencia a tres términos $T_n(x) = 2x T_{n-1}(x) - T_{n-2}(x)$ con $t_0(x) = 1$,
 $t_1(x) = x$,

que el coeficiente de x^n en $T_n(x)$ es $2x$ por el coeficiente de x^{n-1} en $T_{n-1}(x)$, luego el coeficiente de x en $T_1(x)$ es 1, el coeficiente de x^2 en $T_2(x)$ es 2, el coeficiente de x^3 en $T_3(x)$ es 2^2 y así sucesivamente.

9.3 El valor absoluto de $T_n(x)$ es menor o igual a 1

$$|T_n(x)| \leq 1 \quad -1 \leq x \leq 1 \quad \text{para todo } n.$$

Basta simplemente observar su forma trigonométrica

9.4 Valores de x para los cuales

$$T_n(x) = \pm 1 \quad (n > 0)$$

De $T_n(x) = \cos(n \arccos x)$ con $x = \cos \theta$, se tiene $\cos n \theta = \pm 1$ lo cual nos permite concluir que alcanza valores ± 1 alternativamente en los puntos

$$x_j = \cos \frac{j\pi}{n} \quad j = 0, 1, \dots, n$$

$$T_n(x_j) = (-1)^j$$

9.5 Raíces de los polinomios de Chebishev

$T_n(x)$ tiene exactamente n raíces en el intervalo $[-1, 1]$ y puesto que $\cos n\theta = 0$, estas raíces están localizadas en los puntos

$$x_j = \cos \frac{2j+1}{n} \frac{\pi}{2} \quad j = 0, 1, 2 \dots, n$$

9.6 Ortogonalidad de los polinomios de Chebishev .

Los polinomios de Chebishev son ortogonales respecto a la densidad $(1-x^2)^{-1/2}$ en el intervalo $[-1, 1]$

es decir

$$\int_{-1}^1 \frac{T_n(x) T_m(x)}{\sqrt{1-x^2}} dx = \begin{cases} 0 & m \neq n \\ \pi & m = n = 0 \\ \frac{\pi}{2} & m = n \neq 0 \end{cases}$$

Se tiene

$$\int_0^\pi \cos m\theta \cos n\theta d\theta = \begin{cases} 0 & m \neq n \\ \pi & m = n = 0 \\ \frac{\pi}{2} & m = n \neq 0 \end{cases}$$

haciendo $x = \cos\theta$; $\arccos x = \theta$

$$dx = -\operatorname{sen}\theta \, d\theta \quad (\operatorname{sen}\theta = \sqrt{1-x^2}) \quad \text{luego} \quad d\theta = -\frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} \quad dx$$

$$\text{y se tiene} \quad \int_0^{\pi} \cos m\theta \cos n\theta \, d\theta = - \int_1^{-1} \frac{T_m(x) T_n(x)}{\sqrt{1-x^2}} dx =$$

$$\int_{-1}^1 \frac{T_m T_n}{\sqrt{1-x^2}} dx$$

que es el resultado deseado .

BIBLIOGRAFIA

1. Stark, Peter A. Introduction to Numerical Methods. New York, Mac Millan, 1970 .
2. Hamming, Richard. Introduction to applied Numerical Analysis. New York, McGraw-Hill, 1971 .
3. Pennington, Ralph H. Introductory computer Methods and Numerical Analysis. New York, Mac-Millan, 1970
4. Scheid, Francis. Theory and Problems of Numerical Analysis. Schaum's Outline Series. New York, McGraw-Hill, 1968 .

5. Hildebrand, F. B. Introduction to Numerical Analysis.
New York, McGraw-Hill, 1956 .
6. Ralston Anthony. A First course in Numerical Analysis.
New York, MacGraw-Hill, 1965 .
7. Lanczos C. Applied Analysis. Prentice Hall Inc,
Englewood Cliffs N.J., 1956 .
8. Cheney E.W. and H. Loeb. On Rational Chebishev
aproximation. Numer, Math. vol. 4 pags 124-127 (1962).
9. Cheney E. W. and T. H. Southard. A Survey of Methods
for Rational approximation with particular reference
to a new method based on a formula of Darboux .
Si A. M. Rev. vo. 5 pags 219-231 (1963) .

Diogenes ROJAS

Departamento de Matemáticas

Universidad Tecnológica de Pereira

Pereira - Colombia .